


ЗАСТОСУВАННЯ ІМПАКТ® К НА СОНЯШНИКУ



FMC

Нові можливості
старих традицій


За консультаціями та з питань придбання звертайтеся до
регіональних керівників та представників компанії FMC

Регіональні керівники

Ігор Фарміга	Луцьк, Рівне, Львів, Тернопіль, Ужгород, Івано-Франківськ, Чернівці	(050) 443 26 92
Олексій Чернявський ...	Хмельницький, Вінниця, Житомир, Київ,	(095) 277 37 73
Олександр Гвоздь	Черкаси, Кропивницький, Дніпро, Донецьк, Луганськ	(095) 284 95 18
Василь Хміленко	Одеса, Миколаїв, Херсон, Запоріжжя, АР Крим.....	(095) 284 95 09
Олексій Дворський	Чернігів, Суми, Полтава, Харків	(050) 324 00 03

Регіональні представники

Юрій Савченко	Миколаївська область	(050) 410 91 93
Олексій Салгалов	Херсонська та Запорізька область	(095) 284 95 14
В'ячеслав Рябка	Дніпровська область	(095) 284 95 03
Володимир Яровий	Харківська область	(095) 284 95 01
Володимир Курцев	Кіровоградська область	(050) 419 29 63
Олексій Ляховський	Вінницька область	(095) 770 57 32
Ярослав Бай	Рівненська та Волинська область	(066) 721 41 25
Руслан Шмига	Тернопільська область	(050) 950 74 01
Євгеній Клименко	Полтавська область	(050) 355 90 02
Роман Цуркан	Київська область	(095) 284 95 15
Кучерявий Андрій	Менеджер по роботі з ключовими клієнтами	(066) 797 45 43



FMC

ІМПАКТ® К
ПОЗБАВЛЯЄТЬСЯ ВІД ХВОРОБ,
ЯК ВІД БРУДУ

Імпакт® К

Імпакт® К - є одним з найкращих інструментів контролю фомозу, фомопсису, септоріозу, альтернаріозу і зокрема білої гнилі у посівах соняшника. Поєднання двох діючих речовин, які доповнюють одна одну - блискавична швидкість фунгіцидної дії за рахунок мобільності флутріяфолу з його миттєвим проникненням у рослину, швидка дія на патогени за рахунок карбендазиму, роблять Імпакт® К одним з найкращих фунгіцидів для застосування на соняшнику.

ХАРАКТЕРИСТИКА ПРЕПАРАТУ

Діюча речовина	флутріяфол 117,5 г/л +карбендазим 250 г/л
Хімічна група	бензімідазоли + триазоли
Препаративна форма	концентрат суспензії
Розподіл у рослині	системний
Упаковка	каністра 5л
Гарантійний термін зберігання	2 роки

ІМПАКТ® К - ОСОБЛИВОСТІ ЗАСТОСУВАННЯ


- найкращий ефект від застосування фунгіциду Імпакт® К досягається при профілактичному застосуванні або на ранніх стадіях інфікування рослин
- для захисту від вищезгаданих хвороб, Імпакт® К варто застосовувати у фазу розвитку соняшника 4-8 листків (Т1), або ж у фазу розкриття бутону – початок цвітіння (Т2) з нормою застосування 0,8 - 1,0 л/га

ОСНОВНІ ПЕРЕВАГИ ЗАХИСТУ СОНЯШНИКУ ФУНГІЦИДОМ ІМПАКТ® К:

- комплексний захист соняшнику від розширеного спектру хвороб;
- фунгіцид має високу селективність до культур і може застосовуватися навіть за посушливих погодних умов;
- збереження асиміляційної поверхні (листя), що покращує якісні та кількісні показники врожаю;
- позитивний вплив на фотосинтетичну активність у рослин;
- зменшення інфекційного запасу в полі;
- сумісність з більшістю інсектицидів, мікродобрив та стимуляторів росту.
- І, що важливо, ціна фунгіциду - доступна кожному фермеру

Культура	Хвороби	Норма витрати препарату	Спосіб та строки застосування	Кратність обробок
Соняшник	Фомоз, фомопсис, септоріоз, альтернаріоз, іржа, склеротиніоз	0,8-1,0 л/га	В період вегетації	2

ЛІПОФІЛЬНІ ВЛАСТИВОСТІ РІЗНИХ ДІЮЧИХ РЕЧОВИН З ГРУПИ ТРИАЗОЛІВ



ЕФЕКТИВНІСТЬ ДІЇ ТА ФІЗІОЛОГІЧНИЙ ЕФЕКТ ФУНГІЦИДУ ІМПАКТ® К



Імпакт® К, 1,0 л/га (обприскування у стадію 8 листків культури), Харківська обл., 2019 р.

ВИСОКА СТІЙКІСТЬ ДО ЗМИВАННЯ ОПАДАМИ

Препаративна форма фунгіциду Імпакт® К має високу стійкість до змивання опадами. Це забезпечує ефективну дію фунгіциду навіть за несприятливих погодних умов.

ХВОРОБИ СОНЯШНИКУ, ЯКІ КОНТРОЛЮЄ ІМПАКТ® К:

