

Генерал  
на полі

**FMC** | An Agricultural  
Sciences Company

**Комманд**®

Гербіцид

Досходовий гербіцид для якісного контролю однорічних дводольних та деяких однодольних бур'янів у посівах ріпаку, сої, капусти, рису, баштанних культур і картоплі

# Опис препарату

<b>Діюча речовина:</b>	Кломазон – 480 г/л
<b>Препаративна форма:</b>	Концентрат емульсії (к.е.)
<b>Упаковка:</b>	Каністра 5 л



Культура	Норма, л/га	Спектр дії	Фаза внесення
Ріпак	0,2	Однорічні дводольні та деякі злакові бур'яни	Обприскування до появи сходів культури.
Соя	0,2		Обприскування до появи сходів культури. Післясходово у фазі 1-3 трилисника
Кавун, диня, капуста	0,2		Обприскування до появи сходів культури.
Картопля, баклажани	0,2–0,35		Обприскування до появи сходів культури.
Рис	0,5-0,6	Злакові (у т.ч. види плоских), та деякі дводольні бур'яни	1) До сходів 2) У фазу 1-3 листків рису

# Чутливі види бур'янів

- **Лобода біла**
- **Паслін чорний**
- **Канатник Теофраста**
- Дурман звичайний
- Амброзія полинолиста\*
- **Підмаренник чіпкий**
- Хвощ польовий\*\*
- **Гірчак почечуйний**
- Спориш звичайний
- Портулак городній
- **Осот городній**
- Ромашка лікарська
- Роман польовий
- **Талабан польовий**
- Сухоребрик лікарський
- Жабрій звичайний
- Галінсога дрібноквіткова
- **Зірочник середній**
- Кропива глуха
- Череда волосиста
- Чистець однорічний
- Вероніка плющелиста
- **Куряче просо (плоскуха)**
- **Мишій, види**
- Тонконіг звичайний
- Пальчатка криваво-червона

\*Амброзія – досходово

\*\*Хвощ – по вегетації

# Комманд® на озимому ріпаку

## Програма максимального захисту


Комманд® 0,2 л/га +  
метазахлор 2,0 л/га

або

Комманд® 0,2 л/га +  
пропізохлор 2,0 л/га

Сальса® 25 г/га + ПАР Тренд™ 90  
0,3 л/га +  
клопіралід+амінопіралід+пиклорам 0,3 л/га

До сходів



## Схема захисту при досходовому застосуванні


Комманд® 0,2 л/га +  
метрибузин 0,4-0,5 л/га

або

Комманд® 0,2 л/га +  
прометрин 3,0-3,5 л/га

Хармоні® 8 г/га + ПАР  
Тренд™ 90 0,2-0,3 л/га

До сходів



- **Досходове застосування Комманд<sup>®</sup> 0,2 л/га самотійно**
- **Досходове застосування у бакових сумішах**
- Комманд<sup>®</sup> 0,2 л/га + Метрибузин 600 г/л 0,4-0,5 л/га
- Комманд<sup>®</sup> 0,2 л/га + Прометрин 500 г/л 3,0-3,5 л/га
- Комманд<sup>®</sup> 0,2 л/га + Пропізохлор 720 г/л 2,0-2,5 л/га
- **Післясходове застосування - Комманд<sup>®</sup> 0,2 л/га**
- **Комманд<sup>®</sup> 0,2 л/га самотійно**
- **Післясходове застосування у бакових сумішах**
- Комманд<sup>®</sup> 0,2 л/га + Бентазон 480 г/л 1,5-2,0 л/га- по вегетації найбільша ефективність у сумішах із контактними препаратами (д.р. бентазон), ЧЕРЕЗ 4-7 ДНІВ ПІСЛЯ обробки системними препаратами (Хармоні<sup>®</sup>)

## Схема захисту при досходовому застосуванні

Комманд® 0,2 л/га

До сходів





- **Лобода біла**
  - **Паслін чорний**
  - Канатник Теофраста
  - **Дурман звичайний**
  - Амброзія полинолиста\*
  - Підмаренник чіпкий
  - **Хвощ польовий\*\***
  - Гірчак почечуйний
  - Спориш звичайний
  - Кучерявець Софії
  - Осот городній
  - Портулак городній
  - Роман польовий
  - Талабан польовий
  - Сухоребрик лікарський
  - Жабрій звичайний
  - **Галінсога дрібноквіткова**
  - **Зірочник середній**
  - Крופива глуха
  - Череда волосиста
  - Чистець однорічний
  - Вероніка плющелиста
  - **Куряче просо (плоскуха) (досходово)**
  - **Мишій, види (досходово)**
  - Тонконіг звичайний
  - Пальчатка криваво-червона
- \*Амброзія – досходово  
\*\*Хвощ – по вегетації

# Застосування Комманд® на сої

## Схема захисту при досходовому застосуванні


Оптимальні партнери при досходовому внесенні – метрибузин, пропізохлор, прометрин.

При потребі, під час вегетації, можливе застосування страхових гербіцидів.

Комманд® 0,2 л/га +  
метрибузин 0,4-0,5  
л/га або  
пропізохлор або  
прометрин

Хармоні® 8 г/га + ПАР  
Тренд™ 90 0,2-0,3 л/га

До сходів



# Технологія захисту сої

Черкаська обл., Корсунь-Шевченківський район,  
Агроплатформа LG-FMC, червень 2019



**Грунтово: Комманд® 0,2 л/га + пропізохлор 2,0 л/га**

# Технологія захисту сої

Черкаська обл., Корсунь-Шевченківський район,  
Агроплатформа LG-FMC, червень 2019



**Грунтово: Комманд® 0,2 л/га + пропізохлор 2,0 л/га**  
**T1: Хармоні® 8 г/га + ПАР Тренд™ 90 0,3 л/га проти падалиці ріпаку**

Дія суміші бакової суміші Комманд® 0,2 л/га + бентазон 2,0 л/га на паслін чорний (*Solanum nigrum*)  
4 доби після обприскування



Дія бакової суміші Комманд® 0,2 л/га + бентазон 2,0 л/га на берізку польову (*Convolvulus arvensis*)



**Дія бакової суміші Комманд® 0,2 л/га + бентазон 2,0 л/га на падалицю соняшнику**



## Світовий досвід використання (реєстрація)

- Мак
- Горох
- Люцерна
- Кукурудза
- Перець
- Гарбузи
- Кабачки
- Морква
- Огірки
- Цукровий буряк
- Тютюн



# Комманд® на капусті



Капуста оброблена Комманд®. США, 2016р



Черкаська обл., с.Веселий Хутір 2020 р.  
Комманд® на капусті 0,2 л/га (обробіток за 7 днів до висаджування розсади в поле)

# Комманд® на картоплі

Комманд®-0,2 л/га  
+д.р. метрибузин -  
0,5 л/га

Контроль



У деяких рослин  
можливе побіління  
листіків, але наступні  
листки відростають  
без ушкоджень і  
протягом вегетації не  
відмічається  
відставання у рості,  
стресів чи зниження  
товарності або  
врожайності.



**Отже, суміш Комманд® 0,2 л/га + бентазон 2,0 л/га забезпечує контроль перерослих бур'янів:**



- Лобода біла
- Паслін чорний
- Види гірчаків
- Галінсона дрібноквіткова
- Падалиця соняшнику та ріпаку
- Хрестоцвіті види
- Контроль ( у фазу 2-4) листки або пригнічення перерослої берізки польової
- Пригнічення хвоща польового

Шукайте детальну інформацію на нашому сайті

[www.fmc.com.ua](http://www.fmc.com.ua)

та завантажуйте електронний каталог FMC



**Повне портфоліо компанії  
завжди під рукою**

*Завантажуйте та будьте  
постійно на зв'язку з нами!*

