Ефективність перевірена часом

FMC An Agricultural Sciences Company

Ф'юрі®

Інсектицид

Інсектицидний препарат з групи піретроїдів, що здатний вирішити питання більшості шкідників на широкому спектрі культур

Опис препарату

Діюча речовина:

зета-циперметрин – 100 г/л

Норма використання:

0,07 – 0,3 л/га

Препаративна форма:

водний концентрат емульсії

Упаковка:

каністра 5 л

Властивості



Comparison with cypermethrin and alpha-cypermethrin

Isomer	cypermethrin	alpha-cypermethrin	zeta-cypermethrin
1R, cis-R	14	–	3
1S, cis-S	14	–	22
1R, cis-S	11	50	22
1S, cis-R	11	50	3
1R, trans-R	14	–	3
1S, trans-S	14	–	22
1R, trans-S	11	–	22
1S, trans-R	11	–	3

http://www.fao.org/fileadmin/templates/agphome/documents/Pests_Pesticides/JMPR/Evaluation08/Zeta-Cypermethrin.pdf

- Діюча речовина зета- циперметрин- належить до групи піретроїдів, IRAC група 3А, похідна циперметрину
- Містить суміш лише активних цис і транс- стереоізомерів циперметрину в співвідношеннях від 45-55 до 55-45, що й обумовлює його властивості та активність проти різних родів шкідників
- Зета-циперметрин в 2,5-3 рази токсичніший для шкідників, ніж циперметрин

Реєстрація

Культура	Норми витрати препарату, л/га	Норми витрати робочого розчину, л/га	Спектр дії	Спосіб та час обробок, період внесення	Строки останньої обробки (в днях до збирання врожаю)	Кратність обробок
Пшениця озима	0,07-0,10	200-300	Клоп шкідлива черепашка, п'явиці, попелиці, хлібні жуки	Обприскування у період вегетації	20	2
Ячмінь	0,07-0,10	200-300	П'явиці,попелиці	Обприскування у період вегетації	20	2
Картопля	0,07	200-300	Колорадський жук	Обприскування у період масового відродження личинок	20	2
Горох, в т. ч. зелений горошок	0,07-0,10	200-300	Попелиці, зернівка, плодожерки, трипси	Обприскування у період вегетації	30	2
Буряки цукрові*	0,15	200-300	Довгоносики, блішки	Обприскування сходів	20	1
Ріпак	0,1	200-300	Хрестоцвітні блішки, ріпаковий квіткоїд, ріпаковий пильщик, капустяна попелиця, капустяна совка, капустяний та ріпаковий білани, капустяна міль, капустяний листоїд	Обприскування у період вегетації	30	2

*В США на цукровому буряку використовується проти цикадок, попелиці, совок, саранових, бурякових мух

Переваги застосування препарату Ф’юрі

- У світі препарат використовується на 200 культурах проти 100 видів шкідників
- Найбільш економний і технологічний у використанні піретроїдний препарат;
- Володіє нокдаун-ефектом при потраплянні на тіло комах, а також швидкою шлунковою дією;
- Безпечний для теплокровних організмів;
- Період захисної дії складає 7-10 діб;
- Помірно стійкий при високих температурах;
- Відсутній неприємний різкий запах
- Використання дозволяє уникати виникнення резистентності

FMC ТЕХНОЛОГІЯ ЗАХИСТУ ОЗИМОЇ ПШЕНИЦІ

FMC An Agricultural Sciences Company

Ф'юрі® 0,07-0,1 л/га

Вантекс® 0,06-0,07 л/га

Імпакт® К 0,6-0,8 л/га

Данадим® Стабільний 1,0-1,5 л/га

Імпакт® 500 0,25 л/га

Імпакт® 500 0,25 л/га

Імпакт® Т 0,6-1,0 л/га

Еллай® Супер 15 г/га+ ПАР Тренд™ 90 0,25 - 0,3 л/га

Фаместра® 20-30 г/га
+ ПАР Тренд™ 90 0,25 - 0,3 л/га

Калібр® 40-50 г/га
+ ПАР Тренд™ 90 0,25 - 0,3 л/га

Пойнтер® 15-25 г/га
+ ПАР Тренд™ 90 0,25 - 0,3 л/га

Гранстар® Голд 20-33 г/га
+ ПАР Тренд™ 90 0,25 - 0,3 л/га

Пікус® 0,3-0,85 л/т

Вінцит® Форте 1,25 л/т

FMC An Agricultural Sciences Company

Шукайте детальну інформацію на нашому сайті

www.fmc.com.ua

та завантажуйте електронний каталог FMC

GET IT ON Google Play

Download on the App Store

Повне портфоліо компанії завжди під рукою

Завантажуйте та будьте постійно на зв'язку з нами!